Papel do exercício físico sobre a resposta de ativação e migração de macrófagos derivados da medula óssea: relevância para aterogênese

Leonardo H. C. Moi*, Thiago Rentz, Helena C. F. de Oliveira.

Resumo

As doenças cardiovasculares são consideradas as causas de morte mais comuns na sociedade moderna, vitimando cerca de 17 milhões de pessoas todos os anos. A aterosclerose é a complicação que mais contribui para o crescimento epidêmico dessas doenças. O exercício físico está associado com uma série de efeitos protetores contra aterosclerose, incluindo melhora da função endotelial, do perfil de lipoproteínas plasmáticas e estabilização da lesão aterosclerótica. No entanto, o efeito do exercício sobre a inflamação da parede arterial e sobre a ativação de macrófagos não é bem conhecido. O objetivo do trabalho foi avaliar o papel do exercício físico sobre a ativação e migração de macrófagos derivados da medula e sobre o estado inflamatório da lesão aterosclerótica em camundongos hipercolesterolêmicos por deleção do gene para o receptor de LDL (LDLr^{-/-}). Os dados confirmam que o exercício físico possui um papel protetor sobre eventos precoces do desenvolvimento da aterosclerose. Observamos também uma melhora no perfil lipídico e uma redução da área de lesão aórtica. Além disso, demonstramos o efeito do exercício físico em inibir a resposta quimiotática de macrófagos, indicando um fenótipo menos inflamatório dessas células.

Palavras-chave: Aterosclerose; macrófagos; exercício físico.

Introdução e Objetivos

A aterosclerose é a complicação que mais contribui para o crescimento epidêmico das doenças cardiovasculares. Iniciando-se com a infiltração de monócitos circulantes no espaço subendotelial de artérias devido ao acúmulo e retenção de LDL-colesterol. Esses monócitos originam as células espumosas que são capazes de secretar moléculas pró-inflamatórias e fatores de crescimento que contribuem para o processo aterogênico. Nos estágios mais avançados da doença, observa-se um núcleo central da lesão que é rico em cristais de colesterol, debris celulares, e células apoptóticas, devido à morte contínua das células espumosas (Libby 2012). O exercício físico é uma potente estratégia que promove benefícios para prevenção e regressão da aterosclerose, incluindo melhora da função endotelial, do perfil de lipoproteínas plasmáticas e estabilização da lesão aterosclerótica (Ramachandran et al, 2005). O objetivo do trabalho foi avaliar o papel do exercício físico sobre a ativação e migração de macrófagos derivados da medula e sobre o estado inflamatório da lesão aterosclerótica em camundongos hipercolesterolêmicos por deleção do gene para o receptor de LDL (LDLr^{-/-}) submetidos ao exercício físico por 8 semanas, com concomitante dieta rica em gordura.

Resultados e Discussão

Observamos que houve uma redução do peso corporal (20%) assim como de seus níveis de colesterol plasmático (40%) e uma redução para 1/3 da área da lesão aórtica em relação aos sedentários (Fig. 1). De forma inédita, demonstramos o efeito do exercício físico em inibir a resposta quimiotática de macrófagos (Fig. 2), indicando um fenótipo menos inflamatório dessas células.

Figura 1. Peso corporal, triglicérides e colesterol plasmático; Raiz da aorta e área da lesão de camundongos hipercolesterolêmicos submetidos ao exercício físico. . Média ± ep, sedentários (n=9) e exercitados (n=11). *p<0.05 (teste t Student).

Figura 2. Atividade de migração de macrófagos derivados da medula de animais sedentários (LDLr^{-/-}-Sed) e exercitados (LDLr^{-/-}-Exe). Média ± ep, sedentários (n=9) e exercitados (n=11). *p<0.05 (teste t Student).

Conclusões

O exercício físico possui um papel protetor sobre os fatores de risco primários para o desenvolvimento da aterosclerose, ou seja, redução do colesterol e triglicérides plasmáticos. Os dados apresentados nos mostram que, por reduzir a atividade de migração de macrófagos e o tamanho das lesões arteriais, o exercício físico atenua a aterosclerose por reduzir a inflamação local.

Libby, P. (2012). Inflammation in atherosclerosis. *Arteriosclerosis, Thrombosis, and Vascular Biology* 32, 2045-2051

Ramachandran S, Penumetcha M, Merchant NK, Santanam N, Rong R, Parthasarathy S: Exercise reduces preexisting atherosclerotic lesions in LDL receptor knock out mice. *Atherosclerosis*, 178: 33-38, 2005.