Descoberta de uma nova enzima lipolítica capaz de hidrolizar óleo de macaúba com alta acidez

Melque N. P. da Silva*, Letícia L. Rade, Claudia M. de Souza, Ricardo R. Melo, Natalia Milan, Leticia M. Zanthorlin

Resumo

Neste trabalho, uma nova lipase (ReLip) recombinante do fungo *Rasamsonia Emersonii* foi expressa em plataforma microbiana e sua termoestabilidade foi avaliada em diversas condições de pH e na presença de solventes orgânicos. Avaliou-se também a atividade da enzima em diversos óleos vegetais. Uma vez que a ReLip apresentou maior atividade no óleo de macaúba, um planejamento composto central foi realizado usando este óleo, a fim de avaliar a influência da concentração enzimática e do tempo de reação sobre o grau de hidrólise. Os resultados demonstraram que a enzima possui alta termoestabilidade em condições ácidas de pH e na presença dos solventes testados. Além disso, no planejamento experimental com óleo de macaúba, a enzima atingiu grau de hidrólise satisfatório. Tais resultados evidenciam seu potencial na produção de hidrocarbonetos renováveis.

Palavras-chave: Lipase recombinante, biocombustíveis, macaúba.

Introdução

Devido à crescente preocupação ambiental, a produção de biocombustíveis tem ganhado notoriedade. As lipases catalisam a hidrólise de triglicerídeos e vêm ganhando destaque por poderem atuar na cadeia de produção de biocombustíveis. Nesse sentido, a hidrólise de óleos vegetais seguida de descarboxilação e hidrogenação surge como uma nova rota para a produção de hidrocarbonetos renováveis, precursores dos biocombustíveis *drop-in*¹. Este trabalho objetiva expressar em plataforma microbiana uma nova lipase recombinante (ReLip) do fungo *Rasamsonia Emersonii*, avaliar sua temperatura de desnaturação (T_m) em diversas condições de pH e na presença de solventes, bem como avaliar a atividade hidrolítica em óleos vegetais.

Resultados e Discussão

A lipase (ReLip) foi expressa em células de *E. coli* (pRARE II) e purificada por cromatografia de afinidade em coluna de níquel e exclusão molecular. A enzima foi submetida a análises de dicroísmo circular (CD). Conforme apresentado na Tabela 1, a ReLip apresentou alta termoestabilidade em condições ácidas e na presença dos solventes testados, característica pouco comum a lipases. A atividade hidrolítica da ReLip em óleos vegetais (5% m/m em emulsão) também foi estudada em pH 4,0 e 60 °C. Conforme apresentado na Tabela 2, a maior atividade da enzima foi observada no óleo da polpa de macaúba (*Acrocomia aculeata*), provavelmente em razão da elevada acidez desse óleo, já que a ReLip apresentou maior termoestabilidade e pH ótimo em condições ácidas. Desse modo, um planejamento central composto (PCC) foi executado a fim de avaliar a influência da concentração de enzima (C) e do tempo reacional (t) sobre o grau de hidrólise (GH) do óleo da polpa de macaúba, a 35 °C e pH 4,0. Os resultados do planejamento experimental demonstraram que o grau de hidrólise variou de 39% a 80%, sendo este obtido com concentração de 1,69 mg/mL e 13,8 h. Observou-se também que o tempo reacional possui maior efeito sobre o grau de hidrólise, seguido do termo quadrático da concentração de enzima e, por fim, da concentração de enzima. Utilizando análise canônica, o ponto ótimo de 3,0 mg/mL e 14,1 h foi sugerido, com GH predito de 84%. Experimentalmente, um GH de 81,5% e hidrolisado com 92% de ácidos graxos foram obtidos,

mostrando que a lipase possui desempenho semelhante a lipases vegetais e comerciais^{2,3}.

Tabela 1. Temperatura de desnaturação proteica da ReLip em diversas condições.

Condição	T_m (°C)	Condição	T_m (°C)
pH 3,5	76,7±0,2	etanol 30%*	63,8±0,2
pH 4,0	79,2±0,2	etanol 40%*	61,2±1,2
pH 4,5	84,1±0,3	etanol 50%*	57,9±0,6
pH 5,0	82,7±1,2	etanol 60%*	56,2±0,3
pH 5,5	75,7±0,5	metanol 30%*	68,1±0,5
pH 6,0	72,8±0,4	metanol 40%*	62,5±0,2
pH 6,5	74,2±0,3	metanol 50%*	58,4±0,3
pH 7,4	67,6±1,1	metanol 60%*	53,8±0,8

*Testes realizados em pH 4,5.

Tabela 2. Atividade da ReLip em óleos vegetais

Óleo vegetal	A (U/g de lipase)	Óleo vegetal	A (U/g de lipase)
Soja	544±51	Oliva	811±51
Canola	531±78	Palma	615±26
Girassol	788±26	Macaúba	2000±367
Milho	423±26	Residual	282±26
Coco	562±26		

OBS.: U corresponde à quantidade de enzima que libera 1 μmol de ácidos graxos por minuto, sob as condições experimentais.

Conclusões

A expressão em plataforma microbiana desta lipase, nunca antes explorada, foi bem-sucedida, demonstrando seu potencial para ser produzida em maior escala. As análises de CD revelaram a alta termoestabilidade da enzima em condições ácidas de pH e na presença de metanol e etanol, solventes muito utilizados na produção de biocombustíveis. O elevado grau de hidrólise obtido no planejamento e otimização utilizando óleo de macaúba, demonstraram sua grande potencialidade em ser aplicada na produção de biocombustíveis a partir do óleo bruto dessa promissora matéria-prima brasileira.

Agradecimentos

Ao CNPq, à FAPESP (processo nº 18/10517-4) e ao Laboratório Nacional de Biorrenováveis (LNBR).

¹Yan, J., Liu, Y., Wang, C., Han, B., Li, S. *Biotech. for Biofuels*, **2015**, 8(1), 34.

²Aguiaras E.C.G; Cavalcanti-Oliveira E.D.; De Castro A.M.; Langone M.A.P.; Freire D.M.G. *Fuel*, **2014**, 135, 315.

³Raspe D.T., Cardozo Filho L., da Silva C. *Int J Chem Eng*, **2013**, 2013,1.