

USO DO PICC EM UM HOSPITAL UNIVERSITÁRIO

Sonia Regina Perez, Evangelista Dantas¹, A. P. Gadanhoto, A. G. Melo, G.C.V. Bueno, T. C. Lima, T. C. Lima

Resumo

Indicadores institucionais de PICC servem de facilitadores para justificar o uso e avaliar a qualidade em instituições públicas. **OBJETIVO:** Avaliar os indicadores de uso do PICC em um hospital universitário. **MÉTODO:** Estudo quantitativo e descritivo do uso do PICC em um hospital universitário, realizado no período de 1 de janeiro a 31 de dezembro de 2015. **RESULTADOS:** Em 2015 foram utilizados 151 cateteres de PICC sendo 43 (28,47%) na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de Adultos, 48 (31,7%) na UTI Pediátrica, 21 (13,9%) na Pediatria, 17 (11,2%) na Hematologia, 11 (7,2%) no Transplante de Medula Óssea (TMO) e 11 (7,2%) nas Clínicas Médica e Cirúrgica. A média de tempo de internação antes da inserção foi de 24,9 dias (min=1 e Max=72 dias) na UTI adultos; 7 dias (min=1; Max=27) na hematologia; 10,8 dias (min=1; Max=21) no TMO; 30,3 dias (min=1 e Max=242 dias) na UTI Pediátrica e 13,4 dias (min=1 e Max=101 dias) na Pediatria. A Taxa de sucesso de inserção variou de 38 a 100% com diferença significativa entre as unidades. Os principais critérios de indicação foram antibioticoterapia prolongada, drogas irritantes ou vesicantes, nutrição parenteral e quimioterapia. A média de tempo de uso do PICC durante a internação variou de 1 a 40 dias, com diferença significativa entre as unidades. Dezoito pacientes (11,9%) tiveram alta com PICC para uso intermitente ambulatorial, sendo 88,8% para quimioterapia. **CONCLUSÃO:** os indicadores do PICC permitiram avaliação e adequação do processo de uso na instituição.

¹ UNICAMP – Hospital de Clínicas
E-mail: dantas@hc.unicamp.br

Tema: UNICAMP 50 anos: Memórias,
Experiências e Trajetórias Profissionais.

EIXO 1 – Administração e gestão

Palavras-chave Cateteres venosos centrais. Gestão de riscos. Enfermagem.